

Pragas do Alface

- Pragas mais comuns:

Tripes

Danos: adultos e larvas perfuram o tecido vegetal e sugam o conteúdo da célula.

Pulgões

Características: coloração variada de verde, amarelo, rosa, vermelho, roxo e preto; com indivíduos sem asas apteros, e alados.

Danos: adultos e ninfas sugam a seiva e injetam toxinas nas plantas.

- Pragas secundárias:

Inclui insetos variados como: formiga, lagarta falsa etc...

Lagarta falsa medideira

Medidas (características): mariposa com 28 a 40 mm de envergadura.

Danos: causa desfolha parcial das plantas.

Mosca

Medidas (características): larva com 3 mm de comprimento (semelhante a um verme).

Danos: causa necrose e ressecamento das folhas.

Vaquinha

Características: coloração variada de verde, amarelo, preto e branco etc.

Danos: perfura as folhas utilizadas etc.

Paquinha

Características: o adulto mede cerca de 45 mm, de coloração variada em amarelo e marrom escuro.

Danos: causa danos diretos à planta por atingir as raízes.

Lagarta - militar (*Spodoptera frugiperda*)

Características: adulto chega a medir 40 mm de envergadura, de coloração marrom ou cinzenta.

Danos: causa perfuração nas folhas da planta, podendo até mesmo desfolhar a planta parcialmente ou totalmente.

Lagarta - rosca

Características: adulto mede 40 mm com envergadura, com asas anteriores de coloração marrom-escuro, com três manchas triangulares pretas em cada asa.

Danos: essas lagartas promovem o corte de plantas jovens na região do colar, acorretando na morte da planta.

Traya-das-crucíferas

Características: adulto, a mariposa com 12 a 15 mm de envergadura (asa) e cerca de 4,5 mm de comprimento (corpo), suas cores são geralmente cinza ou marrom e delgadas.

Danos: causam perfurações nas folhas e podem desfolhar a planta.

Curuquerê-da-couve

Características: um tipo de borboleta, adulto mede de 45 a 55 mm de envergadura; corpo coberto por pelos esbranquiçados, asas de coloração branco-amarelada.

Danos: causam a desfolha da planta.

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

Fungus gnats

Características: adultos de 2 a 2,5 mm de comprimento, coloração preto-acinzentada, asas transparentes.

Denom: alimentam-se das raízes e radículas e podem chegar a liquecer o caule das mudas no viveiro ou na sementeira.

Lesmas e larvações

Sermas: características: medem de 1,2 a 4 cm de comprimento, coloração variável, de amarela a cinza-escura, podendo apresentar manchas e listras ao longo do dorso.

Caracóis: características: medem de 0,7 a 4,5 cm de comprimento, coloração variada de bege brilhante a marrom escura.

Damages des voracités e lesmas: perfuram irregularmente as folhas da alface, quando a infestação é grande podem ficar apenas as nervuras da planta.

Dentro de nosso livro de referência, há outros tipos de logotipos e marcas, mas as principais são essas listadas / citadas.

Trabalho feito por:

Alvaro Sawada

Braz Antônio

Juliana Santos

Lucas Syravatka

Matheus Giovani