

07/04/2022

Pragas do alface

Pragas mais comuns

Lírios

Danos: Adultos e larvas perfuram os tecidos vegetais e sugam o conteúdo das células.

Pulgões

Característica

Coloração variando verde, amarelada, rosada, avermelhada, roxa e preta; com indivíduos sem asas (apteros) e alados.

Danos: Adultos e ninfas sugam a seiva e injetam toxinas nas plantas.

Pragas secundárias

Insetos cortadores como formigas, lagarto etc...

Danos: Causa necrose e secamentos do

Quem

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 60 dias

Danos - Algumas espécies fazem o ninho superficialmente coberto de palha, fragmentos e resíduos vegetais.

Grilo

Características: Ciclo biológico - ovo, ninfas e adulto - 90 dias.

Plantas: Adultos e ninfas atacam as raízes e a parte aérea das plantas; promovem o corte de mudas e plantas jovens na região do coleto (próximo ao solo), acelerando sua morte.

Raquitismo

Características: Ciclo biológico - ovo, ninfas e adulto. Duração - de 10 a 300 dias.

Plantas: Dentro de túneis, adultos e ninfas causam danos diretos à planta pelo consumo de suas raízes, enquanto o dano indireto ocorre por injúrias mecânicas às raízes durante as escavações redor da planta.

Lagarta-militar

Características: Ciclo biológico - ovo, larvas, pupa e adulto. Duração - 24 a 46 dias.

Plantas: As lagartas atacam as folhas em diferentes fases de desenvolvimento.

Lagarta-roxa

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 34 a 64 dias.

Síntoma: Promove o corte de plantas na região do corte, acarretando sua morte (como as espécies de lagarta-militar). Sob infestação severa, em períodos quentes e secos, torna-se necessária a realização do replantio de mudas.

Lagarta-falsa-medideira

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 21 a 40 dias.

Síntoma: Causam perfurações nas folhas podendo evoluir para uma defolha parcial (grandes orifícios) ou total da planta.

Morstar-minadora

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 14 a 30 dias.

Síntoma: Cria galerias translúcidas ou esbranquiçadas, irregulares, em forma de serpentina nas folhas. Infestação pode provocar necrose e secamento das folhas e defolha precoce, principalmente em plantas jovens de alface.

Triquinha

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 30 a 60 dias.

Planos: Ataca as raízes da planta, enquanto o adulto se alimenta das folhas.

Braga das crucíferas

Características: Ciclo biológico - ovo, lagarta, pupa e adulto. Duração - 11 a 28 dias.

Planos: Causam perfurações e desfolha.

Curupirê da couve

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 26 a 42 dias.

Planos: Causam desfolha.

Lagarta Heliconídea

Características: Ciclo biológico - ovo, larva, pupa e adulto. Duração - 35 a 45 dias.

Planos: Causam desfolha.

Fungus gnath

Parâmetros: Ciclo biológico - ovos, larva, pupa e adulto. Duração - 20 a 36 dias.

Planos: Filém de fungos, as larvas se alimentam das raízes e radículas e podem trepar o caule das mudas no viveiro ou na sementeira.

Lesmas e caracóis

Parâmetros: Ciclo biológico - ovos, imaturo e adulto. Duração - até 6 meses.

Planos: Adultos e imaturos alimentam-se raspando as folhas da alfafa. As folhas atacadas apresentam perfurações irregulares, porém, quando a infestação é severa e a planta atinge o estágio de flor, podem ficar apenas as nervuras.